

包含健康基石

血清

德國麻疹病毒IgG Rubella IgG

評估身體對德國麻疹病毒的「即時防禦」與「長效抗體」狀態

IgG

代表體內具備良好抵抗力。過去曾接種過MMR疫苗，或曾接觸過德國麻疹病毒但體內已成功留下了長效免疫記憶。

披衣菌IgG/IgA Chlamydia IgG/IgA

偵測免疫系統對披衣菌病原體的免疫反應足跡

IgG

提示免疫系統過去曾感染過披衣菌並留下了歷史足跡，不代表目前有活性。

IgA

提示局部黏膜防線（如泌尿道或生殖道黏膜）正處於慢性的持續防禦活躍期。

血庫

ABO/Rh血型檢驗 ABO/Rh

偵測紅血球表面醣鏈抗原/有無D抗原

內分泌

 數值異常建議諮詢「婦產科/生殖醫學科」由專科醫師進行綜合評估

抗穆勒氏管荷爾蒙 AMH

由卵巢內未成熟的小濾泡所分泌，評估卵巢儲備功能最靈敏指標

偏高

代表卵巢內正有大量的基礎小濾泡在發展（庫存量充裕）。通常暗示卵巢內小濾泡數量較多，可能伴隨荷爾蒙調節上的波動。

偏低

代表卵巢的原料庫存與儲備產能下降，暗示卵子庫存量減少，或是卵巢功能步入自然成熟的轉折期。

性病

 數值異常建議諮詢「感染科」由專科醫師進行指引

梅毒血清檢查 RPR/VDRL

偵測梅毒螺旋體破壞人體細胞時所釋放出的非特異性「類脂質抗體」

陽性

提示血液中偵測到相關免疫反應，暗示身體現正受到梅毒影響，或是體內正伴隨特定的自體免疫反應、特殊生理波動(如懷孕)。

HIV初篩 HIV 1+2+O

同時偵測血液中的HIV抗體(1/2/O)與p24早期抗原

陽性

提示體內高度懷疑可能曾與HIV病毒接觸過。由於初篩容易受到體內其他微量免疫抗體交叉干擾，絕對不等於最終診斷。

陰性

代表目前未測得抗原或抗體。但若近期有高風險接觸行為，仍需注意體內是否有2-3週的空窗期效應。